



Rosa Indica Caryophyllæa.

La Bengale Oillet.

P.J. Redouté pinx.

Supplément de Bonnier.

Largillier sculp.

LES ROSES.

69

ROSA INDICA CARYOPHILLEA.

*R. pernanthus ovatis, glabris; pedicellis hispido-glandulosis; cæcis
caulis. N.*

LE BENGAL-ŒUILLET.

DESCRIPTION.

C'est un arbrisseau non-élevé, qui s'élève à la hauteur de quinze à vingt toises au plus. Les rameaux florifères sont, assez généralement, dépourvus d'épines; les rameaux adultes en présentent quelques-uns, assez petits et recourbés. Les feuilles se composent de cinq folioles glabres, vertes en-dessus, plus pâles en-dessous, l'impaire très-aiguë, à dentelure crénelée, chaque dent terminée d'une petite glande. Elles sont portées par un pétiole glanduleux muni, en dessous, de quelques petits aiguillons rougeâtres et crochus; à sa base sont deux stipules foliées et pointues au sommet, dentelées en leur bord. Les fleurs, légèrement odorantes, presque aussi doubles que celles du fl. des Indes-Cent-folies, naissent par trois à l'extrémité des rameaux où elles se réunissent en une espèce d'ombelle. Le tube du calice est ovale, glabre, et marqué de quelques anneaux longitudinaux. Le pédoncule commun est glabre, mais les pédicelles sont hispides-glanduleux. À la base de chaque pédicelle se trouvent des stipules longues et étroites. Les divisions du tube sont simples, pointues au sommet, à bordure pourvue de petites glandes sessiles. Corolle de huit à dix rangs de pétales; d'un beau rose assez foncé, quelques-uns recourbés.